



Backsvalan i Skåne 2003

The Sand Martin Riparia riparia in Scania 2003



"I Skåne är hon, berättar Sven Nilsson i Skandinavisk Fauna 1858, allmän i jordbrinkar, i sandiga stränder och åar, sandgropar, lergrafvar, jordvallar, och i höga stenbroar." På 1940-talet skriver Bertil Hanström (Holmström) att "Allmännast i landet är hon kanske på sina håll i Skåne, ej minst i lertagen vid tegelbruken på Vens nordkust samt under torven i de branta backafallen, som äro så utmärkande för denna ö".

KENNETH BENGTTSSON

Trots frånvaron av äldre skattningar eller antalsuppgifter kan vi nog vara övertygade om att backsvalan förekom betydligt talrikare i Skåne i forna tider än vad den gör idag. Från början av 1980-talet och i samband med atlasinventeringen (i Skåne 1974-1984) bedömdes att 10-15.000 häckande par fanns i landskapet. I redovisningen för Skåne (Andell & Nilsson) kan vi se att hela 249 rutor av totalt 510 konstaterades hysa bebodd koloni. Det vill säga att det under atlasperioden fanns bebodda kolonier i varannan atlasruta – i 50 % av Skåne! Eftersom arten är opportunistiskt lagd och utnyttjar tillfälligt exponerade ytor eller tillfälligt skapade branter har näppeligen samtliga rapporterade rutor hyst häckande backsvalor årligen under hela den tioåriga atlasperioden. Trots detta känns andelen bebodda områden under åren 1974-84 som varande betydligt fler än under 2003. Något försök till landskapstäckande inventering av arten gjordes inte förrän 1994.

Inventeringen 1994

För första gången någonsin inventerades backsvalan i Skåne 1994 (Bengtsson). Denna inventering fokuserade på förekomsten i landskapets olika täkter. Till vår hjälp hade vi

fått uppgifter om samtliga täkter från Länsstyrelsen och totalt inventerades 160 olika områden. I denna summa ingick också spontant rapporterade kolonier i naturliga biotoper, exempelvis från Backafall på Ven och från strandbrinkar längs syd- och ostkusten. Resultatet för inventeringen blev 8869 rapporterade par men i rapporten antogs att den verkliga förekomsten var högre. Från början av 1980-talet och i samband med atlasinventeringen bedömdes att 10-15.000 par fanns i landskapet. Inventeringen 1994 uteslöt inte att detta antal fortfarande var aktuellt. Emellertid – med 2003 års erfarenhet som referens – kan idag bedömas att totalsumman för 1994 näppeligen översteg 10.000 par. Erfarenheterna från 2003 berättar nämligen att det inte finns så många goda bosättningsmöjligheter utanför täkterna.

Inventeringen 2003

Inventeringen genomfördes eftersom SOF utsett arten till riksinventeringsart 2003. Ett uppdrag med metodbeskrivning gick i god tid ut till lokalklubbar och kommunornitologer. Vidare publicerades uppdraget i Anser och på förningens hemsida. Tyvärr fick vi inte samma hjälp av Länsstyrelsen som vid inventeringen



1994. Dom kunde nämligen inte förse oss med aktuella uppgifter om befintliga grustakter i landskapet. Detta var illa och försämrade sannolikt slutresultatet för inventeringen något. Till vår hjälp hade vi istället en delvis inaktuell täktlista från 1999 (erhållen i samband med inventering av svart rödstjärt) samt den gamla listan från 1994. Åtskilliga av täkterna i dessa listor var igenlagda 2003. Värre var att nya täkter inte kom till inventerarnas kännedom. Metodiken för själva inventeringen var tämligen enkel. Vid minst två besök under juni-juli skulle samtliga bohål räknas samt en uppskattning om antalet bebodda hål göras. Vidare önskade vi en lokalbeskrivning (täkt, naturbrant eller annat) samt uppgifter om eventuella hot mot lokalerna.

Resultat

Trots utebliven information om täkterna i landskapet genomfördes inventeringen på ett gediget och vältäckande sätt. Vi gör bedömningen att flertalet kommuner blivit heltäckande inventerade och att goda efterhandsbe-

dömningar har kunnat göras för bristfälligt inventerade kommuner. Det är blott för två kommuner – Kävlinge och Ystad – som resultatet känns riktigt osäkert. För dessa två kommuner har vi istället tvingats göra bedömningar utifrån resultaten för 1994. Även Tomelilla känns aningen underinventerad och för Eslövs del utgör en mycket svårinventerad koloni på Rönneholms mosse (torvtäkt) en möjlig felkälla. Slutresultaten för dessa fyra kommuner är justerade i tabell 1. För övriga dåligt inventerade kommuner (Båstad, Hörby, Perstorp och Staffanstorps) har samtal med boende i kommunerna gett vid handen att det knappast förekommit backsvalor inom kommunens gränser 2003. För kolonier där det blott meddelats antal hål har 65 % av dessa beräknats varit bebodda.

Resultatet när alla uppgifter bokförts och analyserats blir 8646 par (8163 rapporterade). Detta ligger mycket nära resultatet för 1994 års inventering som blev 8869 par. Eftersom vi gör bedömningen att 2003 års inventering är väl genomförd och att missade kolonier är

En del av andra kullen backsvalor på Spillepeng (se mer om den kolonin på nästa uppslag). FOTO: KENNETH BENGTTSSON.





få tror vi att vi kan slå fast att det fanns omkring 9000 par häckande backsvalor i Skåne 2003. Resultatet för 1994 års inventering tros vara något mer i underkant av det verkliga, se

resonemang ovan. Dock är differensen mellan de två inventeringarna så pass liten att vi inte kan slå fast några stora bestandsfluktuationer under den aktuella tioårsperioden.

TABELL 1. ANTAL KOLONIER OCH HÄCKANDE PAR KOMMUNVIS 1994 OCH 2003.

Notera att för 1994 gäller localsiffrorna antalet inventerade lokaler (således även obesatta lokaler) medan siffrorna för 2003 gäller för besatta lokaler.

Skånsk kommun	Inventerade lokaler 1994	Bebodda kolonier 2003	Rapporterade par 1994	Rapporterade par 2003	Bedömning av par 2003	Trend 1994-2003
Bjuv	4	?	60	50	•50	•
Bromölla	2	5	235	247	247	•
Burlöv	1	2	30	351	351	+
Båstad	iu.	0?	iu.	0?	0	?
Eslöv	6	4	357	541	600	+
Helsingborg	iu.	2	iu.	180	180	?
Hässleholm	20	13	951	1599	1599	+
Höganäs	iu.	1	iu.	40	40	?
Hörby	1	1	161	5	5	-
Höör	7	1	91	3	3	-
Klippan	8	4	208	197	197	•
Kristianstad	29	15	1453	1254	1254	-
Kävlinge	7	2	284	60	260	?
Landskrona	1	2	725	990	990	+
Lomma	1	2	0	80	80	+
Lund	5	8	413	378	378	•
Malmö	3	2	363	73	73	-
Osby	iu.	4	iu.	174	174	?
Perstorp	iu.	iu.	iu.	0?	0	?
Simrishamn	9	2	114	80	80	•
Sjöbo	7	6	885	438	438	-
Skurup	3	5	211	222	222	•
Staffanstorp	1	iu.	40	0?	0	-
Svalöv	1	1	0	7	7	•
Svedala	3	3	395	187	187	-
Tomeållar	10	3	70	26	50	•
Trelleborg	4	7	349	271	271	•
Vellinge	3	3	87	104	104	•
Ystad	12	4	398	73	273	?
Åstorp	1	1	260	125	125	-
Ängelholm	5	4	578	125	125	-
Örkelljunga	2	3	17	79	79	+
Östra Göinge	4	1	134	204	204	+
TOTALT	160	111	8869	8163	8646	



Förekomst

Backsvalan är spridd över hela landskapet, men den tätaste förekomsten är idag förlagd till den nordöstra delen. Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner höll 3478 par eller 38,6 % av den totala skånska populationen 2003. För nordvästra Skånes del noterar vi en markant nedgång sedan förra inventeringen. Emellertid förblev flera kommuner i detta område oinventerade 1994 varför siffermässiga jämförelser inte låter sig göras. Men såväl uppgifter från Åstorp och Ängelholm som muntliga uppgifter från ansvariga i KOF talar om en markant minskning av antalet kolonier i regionen.

Kolonierna

Totalt rapporterades 111 kolonier. Den största fanns likt förra gången på Ven och uppskattades till 600 par. Därefter följde Finja, Hässleholm med 520 par, Bäckaskog, Kristianstad 451 par, Glumslövs backar, Landskrona 390 par och Spillepeng, Burlöv 350 par. Genomsnittskolonin bestod av 73,5 par och spannet var 600-1 par.

Vi har fått in lokalbeskrivningar för 91 av de rapporterade 111 kolonierna. Vi finner som väntat en stor dominans för grus-, ler- eller sandtäckter med 50 kolonier (55 %). Därefter följde diverse jordhögar (tex. matjordshögar, jordvallar och vägbyggen) med 21 kolonier, naturliga erosionsbranter med åtta kolonier, kalkbrott – fem kolonier, stenbrott – tre kolonier i samma brott, torvtäckter – två kolonier samt hamnpirar med två kolonier.

Hot

Hot mot kolonier har meddelats i några fall. Utöver det välkända hotet med nedlagda/igenfyllda grustag rapporterades följande hot; räv/grävlingpredation (5), ras (4), igenväxning (3), barn (1), lärkfalk (1), schaktning (1) och skyfall (1). Eftersom backsvalan till stor del är beroende av mänskligt skapade branter i olika täckter är givetvis skötseln och kontinuiteten av lämpliga branter väsentlig för artens fortbestånd. Det vore därför vällovligt om åtminstone delar av nedlagda täckter kunde sparas åt backsvalorna.

Om branter sparas är det emellertid viktigt att sörja för framtida skötsel av dessa. Lämnas dom åt sitt öde så drabbas branterna tämligen snabbt av igenväxning, alternativt av ras. Exemplet från Spillepeng i Burlövs kommun (se *nedan*) visar att iordningställda och skötta branter kan attrahera många backsvalor och att stora kolonier snabbt kan etableras i före detta backsvalefattiga områden.

Något om kolonin på Spillepeng

Några uppgifter om häckningsutfall har inte kommit in och det efterfrågades ej heller i upproppet. En koloni – Spillepeng – följdes emellertid noga varför något kan sägas om just denna. Kolonin ligger inne på SYSAV:s område och branterna justeras med hjälp av SYSAV inför varje säsong. Backsvalorna var igång tidigt vid denna koloni 2003. Redan den 11 maj sågs dom i intensiv trafik med bomaterial (ffa vita fjädrar). Åtskilliga bohål var således färdigrävda redan vid detta datum. Kolonin växte snabbt till rekordantalet 350 bebodda bon och förstakullen flög från och med sista juniveckan. Framgången tycktes ha varit maximal och under veckorna som följde fanns det väldigt många backsvalor i området. Förutom en lyckad jakt av lärkfalk noterades ingen predation under hela säsongen. Backsvalorna var därför mycket mer harmoniska än under fjolåret då varningsläten och tillfälliga flykter från området var frekventa (bl.a. var katt och tornfalk idogt närvarande 2002). Uppskattningsvis 200 par drog framgångsrikt fram även en andra kull och vi misstänker att det också blev några tredjekullar (eventuellt sena andrakullar). Den 13 september sågs den sista ungen sittande i bohålets mynning. Därefter var 136 dagars intensiv och framgångsrik backsvaleproduktion till ända. Och en jobbig tystnad lade sig över nejden!

Vi gissar på 350 x 3 ungar i förstakullen och 200 x 3 ungar i andrakullen. Det innebär i så fall 1650 nya backsvalor från Spillepeng. Eftersom denna koloni är helt befriad från andra hot än naturlig predation är säkerligen framgången här inte representativ för hela Skåne. Dock kan misstänkas att väderförhållanden och



andra betingelser var goda under 2003 varför reproduktionen bör ha varit åtminstone hyfsad för Skåne som helhet.

Referenser

- Andell, P. & Nilsson, L. 1987. Svensk fågelatlas i Skåne. Del 5. Anser 26:241-258.
 Bengtsson, K. 1995. Backsvalan i Skåne 1994. Anser 34:1-6.
 Holmström, C.T. 1942. Våra fåglar i Norden, del 1. Bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm.
 Nilsson, S. 1858. Skandinavisk Fauna. Foglarna. I-II. 3:e uppl. Lund.

SUMMARY

A census of Sand Martin was carried out in Scania in southern Sweden 2003. Almost the whole region was satisfactorily covered and we can with reasonable certainty conclude that 9000

pairs were breeding. The number of living colonies was 111 and most of these were situated in different types of gravel pits. During the 1980ies it was estimated that the population was 10-15000 pairs. A census in 1994 gave 8869 pairs and an estimate gave less than 10000 pairs in the province. The difference between the censuses of 1994 and of 2003 is small and we can not establish any great population fluctuations in the 10 year period. The Sand Martin was also counted in the rest of Sweden during 2003. Analyses of this census is not done yet but strongly indicates greater population fluctuations in many parts of northern Sweden.



KENNETH BENGTSSON
 Grönvägen 5B
 232 32 Arlöv

Gråhäger



GRÅHÄGER. FOTO: JAN ELMELID/N.

- riksinventeringsart 2004

Efter fjolårets batalj med backsvalor är det alltså gråhägerens tur 2004. Tyvärr finns det i skrivande stund ännu inte någon framtagna metodik från huvudmannen SOF. Den är utlovad till VF, nummer 1:2004 (februari). Detta är väl sent för att ge alla lokala inventerarkrafter bra förutsättningar för en väl genomförd inventering. För Skånes del tillkommer ytterligare några försvårande faktorer – dels den pågående Atlasinventeringen, dels det faktum att vi inte lyckats engagera någon regionalt ansvarig att planera, leda och dokumentera inventeringen.

Med ovanstående som argument tar jag mig därför friheten att besluta att vi får göra så gott vi kan och hinner med hägrarna 2004. Atlasinventeringen är det absolut viktigaste under kommande fem år och den vill vi inte konkurrera med. Atlasinventeringen kommer också i sig att ge oss en god bild av såväl geografisk