

Så här skiljer du vinterhämppling från gråsiska och "brunsiska"

Text och foton: Mikael Arinder

Under vintern i Skåne förekommer såväl vinterhämppling som gråsiska av den sydvästkandinaviska underarten *Acanthis flammea cabaret* ("brunsiska") och av den nordliga underarten *A. f. flammea*. Ibland ser man dem alla tre tillsammans. Såväl Danmarks, Norges och Storbritanniens taxonomiska kommittéer som IOC och Clements betraktar brunsiska som en egen art, *Acanthis cabaret*. Brunsiska häckar i Skåne och på västkusten, medan gråsiska av underarten *A. f. flammea* häckar närmast i norra Sverige. Läs mer om gråsiskan och brunsiskan på www.skof.se/fagelintresse/artfakta/grasiska. Vinterhämppling häckar i bergsområden och på kustnära hedar, närmast i Norge, och övervintrar bl.a. i södra Sverige.

Så här skiljer du dem åt

Vinterhämppling (V) är en ganska mörk fågel utan speciella kännetecken samt med gulbrunt ansikte. Brunsiska (B) ger ett allmänt beiget intryck med tydlig huvudteckning. Gråsiska (G) är vit undertill i kontrast mot gråbrun rygg (à la vattenpiplärka) med tydlig huvudteckning. Brunsiskan är något mindre än gråsiskan.

1. Gråsiska och brunsiska har röd pannfläck och svart haklapp. Vinterhämppling saknar dessa båda karkatärer, men har gulbrun bottenfärg runt ögat och på hakan.
2. Såväl vinterhämppling som brunsiska har varmbeige flanker och bröst med vit buk. Gråsiska har vitaktiga flanker, bröst och buk. Vinterhämppling har fint streckat bröst och flanker, medan gråsiska och brunsiska har grov streckning.
3. Vinterhämppling är mörkstreckat brun på ryggen, medan både gråsiska och brunsiska har en lite ljusare brun rygg. En del gråsiskor har två ljusa streck på ryggen och vitaktig övergump, medan dessa karaktärer sällan är tydliga på vare sig brunsiska eller vinterhämppling. Adulta hanar av vinterhämppling är rosa på övergumpen.

