

Vita och vackra – så här skiljer du dem åt


Text & foton: Mikael Arinder

Ägretthäger




1. Stor som en gråhäger. Långhalsad och gänglig.
2. Grov näbb som ofta är gul, men som blir övervägande svart under häcktid.
3. Gulgrön tygel.
4. Mungipan slutar bakom ögat.
5. Svartbruna tår och tarser, och gulaktiga tibia (lår).
6. Saknar alltid nackplym.
7. Förekommer i Skåne året om, och är tämligen allmän under vår och höst.

Silkeshäger



1. Liten och nätt.
2. Tunn, lång svart näbb.
3. Blågrå tygel, men blir rödaktig under parningstid.
4. Mungipan slutar under ögat.
5. Gula tår och svarta ben.
6. Kan ha nackplym (två förlängda nackfjädrar).
7. Förekommer sällsynt under april–oktober, främst om våren.



1. Vingarna är fästa ganska långt fram på fågeln.
2. Långa vingar.
3. Långa ben. Svartbruna tår.
4. Långsamma, värdiga vingslag likt gråhäger.



1. Vingarna är fästa mitt på fågeln.
2. Vingspann som skrattnäs.
3. Benen sticker inte ut så långt. Gula tår.
4. Snabba vingslag, inte olik dvärgmås i frekvens.



Ägretthäger. Foto: Mikael Arinder.